

INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E/O PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO

PREGRESSA ANAFILASSI (da alimenti o veleno di imenotteri)

PIANO D'AZIONE PERSONALIZZATO

Cognome e Nome _____

Classe _____ \SCUOLA _____

Allergia a : _____

I SEGNI DI REAZIONE ALLERGICA INCLUDONO:

1. Occhi: arrossamento e/o sfregamento degli occhi, lacrimazione
2. Naso: starnuti ripetuti, prurito nasale, naso “che cola”, sensazione acuta di naso tappato
3. Bocca: prurito e gonfiore delle labbra, lingua o bocca
4. Cute: senso di calore, prurito al cuoio capelluto, orticaria, eruzione pruriginosa e/o gonfiore della faccia o di mani / piedi e/o della zona perigenitale
5. Intestino: nausea, crampi addominali, vomito e/o diarrea
6. Respiro alterato :
 - A. lievi accessi di tosse e respiro lievemente accelerato
 - B. senso di chiusura e/o nodo alla gola e/o senso di soffocamento, raucedine acuta, importante difficoltà respiratoria, cianosi, arresto respiratorio
7. Circolo: pallore intenso, debolezza, sonnolenza, **PERDITA DI COSCIENZA**

La severità dei sintomi può cambiare rapidamente evolvendo in situazioni pericolose per la vita!

COSA FARE:

se l'assunzione\puntura è CERTA oppure è SOSPETTATA in base alla comparsa di uno o più tra i sintomi elencati **chiamare SUBITO il 112 (per sospetta ANAFILASSI)**

SE COMPAIONO UNO O PIU' SINTOMI tra quelli elencati da 1 a 5 somministrare SUBITO

() Formistin o Zirtec gtt _____ (1gtt\2kg)

() Kestine 10 mg lio

() Bentelan compresse da 1 mg _____ compressa/e per bocca (0,1-0,2 mg\Kg)

() altro _____

QUALORA COMPARISSE IL SINTOMO 6 A

somministrare oltre a cortisone e antistaminico Ventolin o Broncovaleas spray: 2 puff subito, ripetibili OGNI 20' FINO AD UN MASSIMO DI 3 VOLTE.

- agitare la bomboletta
- uno spruzzo di Ventolin o Broncovaleas nel distanziatore
- far eseguire 5 respiri profondi attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca
- subito dopo i 5 respiri agitare la bomboletta e ripetere lo spruzzo di Ventolin o Broncovaleas
- far eseguire 5 respiri profondi attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca

Dopo 20 Minuti, Se Necessario Ripetere Il Ciclo (1 spruzzo-5 respiri + 1 spruzzo-5 respiri)

Altra prescrizione:

QUALORA COMPARISSERO I SINTOMI 6 B e/o 7 somministrare adrenalina autoiniettabile:

- | | | |
|--|---------------------------------------|--|
| ☐ FAST JEKT 150 mcg | ☐ JEXT 150 mcg | ☐ CHENPEN 150 mcg |
| ☐ FAST JEKT 300 mcg | ☐ JEXT 300 mcg | ☐ CHENPEN 300 mcg |

Avvisare la madre _____ il padre _____

NON ESITARE NEL CONTATTARE IL 112 E NEL SOMMINISTRARE I FARMACI ANCHE SE I GENITORI NON POSSONO ESSERE RINTRACCIATI.

data: _____

Timbro e Firma Medico del SSR che ha formulato il
piano terapeutico e/o che ha prescritto la
somministrazione del farmaco o l'intervento specifico.
