



Consumo di alcol tra i residenti ASL NO

Fonte dati: PASSI (POPOLAZIONE 18-69 ANNI)

Consumo di alcol per tipologia e sesso Periodo 2022-2023




Bevitori a maggior rischio Trend 2010-2023



Bevitori a maggior rischio che hanno ricevuto il consiglio* di bere meno da un medico o da un operatore sanitario

Trend 2010-2023



*Negli ultimi 12 mesi, calcolato tra coloro che sono stati da un medico o un operatore sanitario.

L'assunzione di alcol oltre ai danni diretti sulla salute può causare comportamenti a rischio per se stessi e per gli altri.

Nell'ASL NO, coloro che dichiarano di aver bevuto almeno un'unità alcolica nell'ultimo mese, nel periodo 2022-2023 (78%) sono in aumento rispetto agli anni precedenti.

Nell'ASL NO quasi 1 adulto su 3 (32%) dichiara almeno una modalità di consumo di alcol a maggior rischio.

Il consumo di alcol prevalentemente fuori pasto e quello *binge* sono le modalità a rischio più diffuse (17%).

Rispetto al Piemonte la ASL NO registra valori superiori sia di persone che assumono bevande alcoliche, che di bevitori a maggior rischio.

Nel 2022-2023, solo il 6% dei bevitori a maggior rischio ha ricevuto il consiglio di bere meno da un medico o da un operatore sanitario.